


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ИНСТРУКЦИЯ
(информация для пациентов)
по медицинскому применению лекарственного средства
НАТРИЯ НУКЛЕИНАТ

Торговое название: Натрия нуклеинат.

Международное непатентованное название: нет.

Форма выпуска: капсулы 100 мг.

Описание: капсулы твердые желатиновые желтого цвета, номер 1.

Состав на одну капсулу:

активное вещество – натрия нуклеината – 100 мг;

вспомогательные вещества – кальция стеарат (Е - 470), повидон (Е - 1201).

Состав оболочки капсулы твердой желатиновой: желатин, глицерин (Е - 422), вода очищенная, титана диоксид (Е - 171), натрия лаурилсульфат (Е - 487), красители: хинолиновый желтый (Е - 104), апельсиновый желтый (Е - 110)

Фармакотерапевтическая группа: Другие иммуностимуляторы.

Код ATC: L03AX.

Фармакологическое действие

Иммуномодулирующее средство, оказывает иммуностимулирующее действие: повышает миграцию Т-лимфоцитов и их кооперацию с В-лимфоцитами, усиливает фагоцитарную активность макрофагов и продукцию факторов неспецифической резистентности. Стимулирует внутриклеточный метаболизм и нуклеиновый обмен. Ускоряет процессы регенерации тканей, стимулирует костномозговое кроветворение, в том числе лейкопоэз.

Показания к применению

В комплексной терапии:

- вторичных иммунодефицитов;
- инфекционных заболеваний, протекающих на фоне иммунодефицитных состояний;
- лейкопении, агранулоцитоза.


Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь после еды. В качестве иммуностимулирующего средства взрослым назначают в суточной дозе 1000-2000 мг (10-20 капсул по 100 мг) в 3-4 приема, курс лечения – от 2 недель до 3 месяцев и более.

Пациентам с нарушенной функцией почек и печени, а также людям пожилого и старческого возраста с пониженной иммунологической активностью назначают в дозе 1000-1500 мг/сутки (10-15 капсул по 100 мг) в течение 2-3 недель 2 раза в год (весной и осенью).

При лейкопении взрослым назначают по 1000-2000 мг/сутки (10-20 капсул по 100 мг) в 3-4 приема, курс лечения – 10 дней и более в зависимости от течения заболевания.

Дети. Эффективность и безопасность применения у детей не доказана.



Побочное действие

Угнетение центральной нервной системы, брадикардия, одышка; в редких случаях – аллергические реакции.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему веществу или любому из компонентов препарата, органические заболевания миокарда с нарушением проводимости; детский возраст до 6 лет (для данной лекарственной формы), беременность, период лактации.

Передозировка

До настоящего времени данных о передозировке препарата не получено.

Меры предосторожности

В состав лекарственного средства входят красители хинолиновый желтый (Е 104) и апельсиновый желтый (Е 110), которые могут вызывать аллергические реакции.

В процессе лечения рекомендуется периодический контроль уровня лейкоцитов в крови и иммунного статуса. Необходимо соблюдать осторожность и контролировать уровень мочевой кислоты у пациентов с подагрой.

Применение во время беременности и в период лактации: противопоказано применение во время беременности и в период лактации (при необходимости приема препарата следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания).

Влияние на способность к управлению автотранспортом и потенциально опасными механизмами: препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и потенциально опасными механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При назначении натрия нуклеината совместно с другими лекарственными средствами неблагоприятных эффектов не описано.

Условия хранения

В защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Упаковка

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке. По 2 или 3 контурные упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель:
РУП "Белмедпрепараты",
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
ул. Фабрициуса, 30, т./ф.: (+375 17) 220 37 16,
e-mail: medic@belmedpreparaty.com.

