


# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



## ЛИСТОК - В КЛАДЫШ информация по медицинскому применению лекарственного средства **Боярышник** настойка для внутреннего применения

### Регистрационный номер

Название лекарственного средства Боярышник.

Форма выпуска Настойка для внутреннего применения.

Общая характеристика Прозрачная жидкость красновато-коричневого цвета. В процессе хранения допускается выпадение осадка.

### Состав лекарственного средства

Спиртовое извлечение из плодов боярышника 1:10.

Содержит не менее 65 % этанола.

Фармакотерапевтическая группа Прочие средства для лечения заболеваний сердца.

### Фармакологические свойства

Биологически активные вещества, содержащиеся в плодах боярышника, оказывают умеренное кардиотоническое, гипотензивное, спазмолитическое, седативное действие, урежают частоту сердечных сокращений, способствуют улучшению коронарного кровообращения.

### Показания к применению

В комплексной терапии функциональных нарушений сердечно-сосудистой деятельности, астено-невротических состояний.

### Способ применения и дозировка

Принимают внутрь до еды. Взрослым рекомендуется принимать по 20-30 капель настойки, разведенных в  $\frac{1}{4}$  стакана воды, 3 раза в день. Детям старше 12 лет 3 раза в день столько капель на прием, сколько лет ребенку.

Длительность курса лечения определяется врачом с учётом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Не рекомендуется применять настойку в течение длительного времени из-за содержания этанола. Продолжительность приема у детей должна быть минимальной. Во время лечения необходимо избегать приема других этанолсодержащих средств.

### Побочное действие

В отдельных случаях возможны аллергические реакции (крапивница, зуд). При длительном применении в больших дозах возможны брадикардия, артериальная гипотензия.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

### Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, детский возраст до 12 лет, беременность и период лактации.

### С осторожностью

С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, эпилепсия, черепно-мозговая травма и другие заболевания головного мозга со снижением судорожного порога.

### Передозировка

Возможно возникновение сонливости, брадикардии, артериальной гипотензии, головокружения, что требует отмены лекарственного средства. Лечение симптоматическое.

### Меры предосторожности

Лекарственное средство не рекомендуется к применению внутрь при беременности и в период лактации вследствие содержания этилового спирта.

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача для точной диагностики заболевания. Во время лечения необходим контроль артериального давления и ЭКГ-мониторирование.

Если во время лечения симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, развиваются отеки нижних конечностей, необходимо обратиться к врачу. Необходима немедленная медицинская помощь при возникновении боли в области сердца с иррадиацией в руку, верхнюю часть живота, шею, или в случае развития дыхательной недостаточности (например, одышка).

Лекарственное средство содержит не менее 65 % этилового спирта, то есть 256-384 мг на разовую дозу (20-30 капель).

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами**

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

При сочетании с сердечными гликозидами эффект последних усиливается. Прием с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с возможностью образования отрицательных комплексов. Не рекомендуется одновременное применение с антиаритмическими средствами III класса, а также с цизапридом.

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.

Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:

- лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем: дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксифен, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид и другие гипогликемические препараты, гризофульвин, метронидазол, орнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарбазин.
- лекарственные средства, угнетающие функции центральной нервной системы.

**Условия и срок хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. При хранении допускается выпадение осадка.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Упаковка**

50 мл во флаконах в упаковке № 1.

**Производитель**

СОАО «Ферайн»,

Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52 а,  
тел. + 375 17 213-16-37, +375 17 213-12-58; тел./факс + 375 17 222-92-18.