

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА**  
(информация для пациента)

**НАЗВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА**

Торговое название: РЕКРЕОЛ®

Международное непатентованное название: декспантенол

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА**

Мазь для наружного применения 50 мг/г

**ОПИСАНИЕ**

Гомогенная белая или белая с желтоватым оттенком мазь со специфическим запахом.

**СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА**

1 г мази содержит:

*активное вещество:* декспантенол - 50 мг;*вспомогательные вещества:* стеариловый спирт; цетиловый спирт; воск пчелиный белый; протегин ХN; масло миндальное; парафин мягкий белый; парафин жидкий; ланолин (овечий жир); вода очищенная до 1 г.**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА**

Средства для лечения ран и язв. Ранозаживляющие средства.

Код АТХ: D03AX03

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА****Фармакодинамика**

Декспантенол в тканях превращается в пантотеновую кислоту, которая является составной частью кофермента А (СоА) и играет важную роль в поддержании нормальной функции эпителия, увеличении пролиферации фибробластов и ускорении регенерации кожи в процессе заживления ран.

Этот процесс деления клеток и формирования новых тканей кожи восстанавливает эластичность кожи и стимулирует заживление ран.

**Фармакокинетика**Всасывание


Декспантенол быстро всасывается в коже, незамедлительно превращается в пантотеновую кислоту, которая широко распространяется в тканях организма, в основном в форме кофермента А.

Распространение

После местного применения лекарства пантотеновая кислота концентрируется в волосах, в корнях волос, в ногтях, в эпидермисе и дерме.

Выведение

Пантотеновая кислота выводится преимущественно в неизменном виде с мочой и в меньшей степени с калом.



**ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ**

Для лечения поверхностных повреждений кожи (небольших ожогов и трещин кожи, ссадин и растрескиваний кожи), воспаления кожи (возникающего при воздействии лучевой терапии, фототерапии или ультрафиолетового излучения).

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ**

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в этой инструкции, или же так, как указал Вам врач или фармацевт. В случае неясности спрашивайте врача или фармацевта.

Для наружного применения.

Если не указано иначе, мазь наносят тонким слоем на поврежденный участок кожи один или несколько раз в день. Продолжительность курса лечения зависит от характера и степени тяжести заболевания.

**Дети**

Декспантенол можно применять детям.

**Пациенты с нарушениями деятельности почек и печени**

Исследования пациентам с нарушениями деятельности почек и печени не проводились.

**Пациенты пожилого возраста**

Исследования у пожилых пациентов (в возрасте от 65 лет и старше) не проводились.

Если Вам кажется, что действие мази Рекреол® слишком сильное или слишком слабое, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

**ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

Подобно всем лекарствам, это лекарство может вызывать побочные действия, хотя не у всех они проявляются.

Побочные действия приведены соответственно базе данных классификации систем органов и частоты встречаемости MedDRA: очень редко (<1/10 000).

**Со стороны иммунной системы**

Очень редко: аллергические реакции и аллергические реакции кожи.

**Со стороны кожи и подкожных тканей**

Очень редко: контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, покраснение кожи, экзема, высыпания, крапивница, раздражение и язвы кожи.

*При появлении перечисленных побочных действий, а также при появлении побочных действий, не упомянутых в инструкции, необходимо обратиться к врачу.*


**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

- Повышенная чувствительность к декспантенолу или какому-либо другому вспомогательному веществу;
- декспантенол противопоказан для применения на раны пациентам с гемофилией, в связи с высоким риском кровотечения.

**ПЕРЕДОЗИРОВКА**

Случаи передозировки людям не доступны. Даже в случае применения чрезмерного количества декспантенола, он имеет низкую токсичность, и не вызывает нежелательных побочных действий, вызывающих угрозу для здоровья пациента.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь



**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Следует избегать случайного попадания мази Рекреол® в глаза.

Применения мази Рекреол® следует прекратить в случае возникновения признаков аллергической реакции.

Если Вы не чувствуете себя лучше или чувствуете себя хуже спустя 14 дней после начала применения, Вам следует проконсультироваться с врачом.

Рекреол® содержит ланолин и цетиловый спирт, которые могут вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

***Применение в период беременности или кормления грудью и фертильность.***

Мазь Рекреол® можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания.

Исследования воздействия декспантенола на фертильность человека не проводились.

***Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.***

Мазь Рекреол® не влияет на способность управлять транспортными средствами и обслуживать механизмы.

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ**

Расскажите врачу или фармацевту обо всех лекарствах, которые применяете в последнее время, применяли или могли бы применять.

Нет доказательств того, что мазь Рекреол® взаимодействует с другими лекарствами.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**СРОК ГОДНОСТИ**

2,5 года.

**УСЛОВИЯ ОТПУСКА**

Без рецепта.

**УПАКОВКА**

По 30 г или 50 г в тубе алюминиевой с защитной алюминиевой мембраной на горловине и конусообразным приспособлением для прокола мембраны в навинчивающемся бушоне из пластмассы.

1 туба в пачке картонной вместе с инструкцией по применению.

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ (ЗАЯВИТЕЛЕ)**

АО «Гриндекс». Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия

Дата последней корректировки текста: июнь 2021 г.

<b>СОГЛАСОВАНО</b> МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь
--