

Листок-вкладыш: информация для потребителя
Экзофин® , 10 мг/мл, раствор для наружного применения
нафтифина гидрохлорид

Прочитайте внимательно листок-вкладыш перед началом применения лекарственного препарата, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 4 недели Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что представляет собой лекарственный препарат Экзофин®, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением лекарственного препарата Экзофин®
3. Как применять лекарственный препарат Экзофин®
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение лекарственного препарата Экзофин®
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что представляет собой лекарственный препарат Экзофин®, и для чего его применяют

Лекарственный препарат Экзофин® содержит действующее вещество нафтифин, обладающее противогрибковым действием. Нафтифин проявляет умеренную активность против дрожжевых, плесневых и других грибов. Он также эффективен против различных бактерий, которые часто встречаются при грибковых заболеваниях.

Препарат Экзофин® предназначен для наружного применения у взрослых при грибковых заболеваниях кожи и кожных складок, ступней (особенно в пространстве между пальцами и подошвами) и кистей рук, кожных кандидозах, а также при грибковых инфекциях ногтей, отрубевидном лишае.

Если улучшение не наступило, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением лекарственного препарата Экзофин®
Не применяйте препарат Экзофин®:

– если у Вас повышенная чувствительность (аллергия) к действующему веществу нафтифин или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.

Особые указания и меры предосторожности при применении

Перед применением препарата Экзофин® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат Экзофин® предназначен исключительно для наружного применения.

Нельзя допускать попадания раствора в глаза. Препарат нельзя применять на открытых ранах или поврежденной коже, так как в нем содержится спирт, который может вызвать болезненное жжение.

Если жалобы не проходят, или лечение не принесло ожидаемого результата, рекомендуется как можно быстрее обратиться за консультацией к врачу.

Другие препараты и препарат Экзофин®

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты, в том числе те, которые отпускаются без рецепта врача.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны, кормите грудью, предполагаете, что беременны, или планируете беременность, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата Экзофин®.

В качестве меры предосторожности следует избегать использования лекарственного препарата Экзофин® во время беременности и кормления грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Экзофин® не влияет на способность управлять автомобилем и механизмами.

Вспомогательные вещества

Препарат Экзофин® содержит пропиленгликоль, который может вызывать раздражение кожи.

3. Как применять лекарственный препарат Экзофин®

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемые дозы

Необходимо строго соблюдать рекомендации по дозированию.

– Грибковые инфекции кожи

Препарат применяется один раз в сутки. На предварительно очищенную и высушенную пораженную кожу и прилегающие к ней участки наносят раствор в количестве, достаточном для тщательного увлажнения.

– Грибковые инфекции ногтей

Для лечения грибковых инфекций ногтей препарат применяют два раза в сутки, нанося со свободного края ногтя.

Перед первым применением препарата максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами и пилкой для ногтей.

Дети и подростки: безопасность и эффективность нафтифина у детей и подростков до 18 лет не доказана (данные отсутствуют).

Пациенты с почечной или печеночной недостаточностью: коррекции дозы не требуется.

Пожилые пациенты: коррекции дозы не требуется.

Способ применения

Препарат Экзофин® предназначен только для наружного применения на коже или ногтях. Раствор наносят прямо из флакона или ватным тампоном.

Препарат наносят неразбавленным и не смешивают с другими препаратами для наружного применения, поскольку из-за сниженной концентрации эффективность активного вещества может быть недостаточной.

Для устранения грибковой инфекции рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

1. Грибок может попадать на одежду и/или носки, вступающие в контакт с областью пораженной кожи/ногтя, поэтому одежду и/или носки следует менять каждый день.

2. Поддержание пораженной поверхности кожи/ногтя в сухом состоянии обеспечивает хорошую защиту от распространения грибковой инфекции. Не рекомендуется покрывать пораженный участок плотной тканью или носить одежду/обувь, которые ограничивают или препятствуют вентиляции (к примеру, чулки, изготовленные из синтетических волокон, тесная обувь). Пораженный участок кожи/ногтя следует тщательно просушить после мытья. Также следует ежедневно менять полотенца, одежду и/или носки, соприкасающиеся с пораженной поверхностью.
3. В случае грибкового заболевания стоп не следует ходить босиком дома или в общественных местах, чтобы предотвратить повторное инфицирование или распространение патогенных возбудителей.
4. Сауны или бани можно посещать только после полного излечения от грибковой инфекции.

Длительность применения

Для предотвращения рецидива инфекции лечение продолжают еще не менее двух недель после клинического выздоровления.

Если в течение 4 недель применения препарата не наблюдается клинического улучшения, необходимо обратиться к врачу.

Если Вы применили большее количество лекарственного препарата Экзофин[®], чем следовало

При наружном применении препарата Экзофин[®] опасных для жизни последствий не ожидается. При случайном или преднамеренном проглатывании необходимо срочно обратиться к врачу.

Если Вы забыли применить препарат Экзофин[®]

Если Вы забыли нанести препарат Экзофин[®] в запланированное время, сделайте это, когда вспомните: не следует применять двойную дозу для компенсации пропущенной.

Если Вы досрочно прекратили лечение препаратом Экзофин[®]

Если Вы прекратили лечение препаратом досрочно, возможен рецидив грибковой инфекции. Важно соблюдать рекомендуемую продолжительность лечения, несмотря на улучшение состояния.

В случае возникновения дополнительных вопросов по применению лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Экзофин[®] может вызывать нежелательные реакции, но они возникают не у всех.

Во время применения препарата могут возникать следующие нежелательные эффекты, частота которых неизвестна (не может быть оценена на основании имеющихся данных): местные симптомы раздражения, такие как кожная сыпь, ощущение сухости, жжения, покраснение кожи.

Данные нежелательные реакции обычно проходят после прекращения лечения.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза:

Республика Беларусь

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: <http://www.rceth.by>

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение лекарственного препарата Экзофин®

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном и невидном для детей месте.

Срок годности 3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок хранения после вскрытия флакона 28 дней.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препарата, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Экзофин® содержит в качестве действующего вещества нафтифина гидрохлорид.

В 1 мл раствора содержится 10,0 мг нафтифина гидрохлорида.

Вспомогательные вещества: этанол (в виде этилового спирта 96 %), пропиленгликоль (E1520), вода очищенная.

Внешний вид лекарственного препарата Экзофин® и содержимое упаковки

Раствор для наружного применения.

Прозрачный, бесцветный или слегка желтоватый раствор с запахом этанола.

По 10 мл и 20 мл во флаконах полиэтиленовых, укупоренных крышками винтовыми с предохранительным кольцом и вставкой-капельницей или во флаконах из литого коричневого стекла, укупоренных крышками винтовыми с кольцом первого вскрытия и пробкой-капельницей.

По 20 мл во флаконах из полиэтилентерефталата, укупоренных крышками винтовыми с кольцом первого вскрытия и пробкой-капельницей.

Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ООО «Фармтехнология»

Республика Беларусь, 220024 г. Минск, ул. Корженевского, 22.

Телефон/факс: (017) 309 44 88.

E-mail: ft@ft.by.