

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

КЛЕЙ БФ-6



Регистрационный номер:

Торговое наименование: КЛЕЙ БФ-6

Международное непатентованное или группировочное наименование: Фенолформальдегидная смола

Лекарственная форма: раствор для наружного применения спиртовой

Состав на 1 г:

Действующее вещество:

Фенолформальдегидная смола (лак бакелитовый) 16,5 мг

Вспомогательные вещества:

Поливинилбутирал (поливинилбутираль) 97,0 мг

Дибутилфталат 35,0 мг

Касторовое масло 17,5 мг

Канифоль 8,5 мг

Этанол (спирт этиловый) 95 % 825,5 мг

Описание: прозрачная или слегка мутная жидкость от светло-желтого до красноватого цвета вязкой консистенции с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ: D08AE

Фармакологические свойства:

Оказывает ранозаживляющее и антисептическое действие. Используется как бактерицидное и изолирующее средство, способствует заживлению мелких повреждений кожи вследствие образования на их поверхности изолирующей плёнки, стойкой к механическим и химическим воздействиям.

Показания к применению:

Препарат применяют для обработки микротравм (ссадин, царапин, порезов и других мелких повреждений кожи), послеоперационных швов.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 1 года.

135381

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

На основании существующих данных, применение в терапевтических дозах при беременности не оказывает отрицательного влияния на развивающийся плод.

Перед применением препарата, если вы беременны, или предполагаете, что вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.

Возможно применение в период грудного вскармливания. Перед применением в период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Перед нанесением препарата участок кожи тщательно очищают от загрязнения. Ватным или марлевым тампоном останавливают кровотечение и просушивают место, которое необходимо покрыть клеем. Препарат наносят непосредственно на поврежденную поверхность тонким слоем, захватывая окружающие здоровые ткани. В случае нарушения целостности пленки сверху на нее наносят новую пленку.

Пленка образует в течение 2-5 минут после нанесения препарата и прочно удерживается на коже на протяжении 2-3 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие:

Жжение в месте нанесения, аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о нежелательных проявлениях лекарственного взаимодействия отсутствуют.

Особые указания:

Препарат предназначен только для наружного применения.

Избегать попадания на слизистые оболочки глаз.

Не отмечено влияние применения препарата на течение хронических заболеваний.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска:

Раствор для наружного применения спиртовой.

По 5, 10, 15, 25 и 40 г в тубы алюминиевые в комплекте с колпачками полимерными, или в тубы алюминиевые в комплекте с бушонами полимерными, или в тубы алюминиевые в комплекте с колпачками-бушонами полимерными, или в тубы из комбинированного материала в комплекте с бушонами полимерными.

По 5, 10 и 30 г во флаконы-капельницы полимерные с винтовой горловиной из полиэтилена низкого или высокого давления, укупоренные пробками-капельницами полимерными типа ПК-3 из полиэтилена низкого или высокого давления и навинчиваемыми полимерными крышками типа КН-3 из полиэтилена низкого давления. На флаконы-капельницы наклеивают этикетки.

Каждую тубу или флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона хром-эрзац.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С, вдали от источников нагрева и открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

4 года. Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска:

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения:

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТ», Россия, 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 25, офис 5 этаж.

Организация, принимающая претензии:

ОАО «Самарамедпром», Россия, 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86. Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.


Адрес места производства:

Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 99Б;

Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

Генеральный директор

ООО «ВЕСТ»



Торгомян К. Г.

135381