Назначение витамина Е в высоких дозах может вызвать дефицит витамина А в организме. Колестирамин, колестипол, минеральные масла снижают всасывание альфа-токоферола ацетата. Высокие дозы железа усиливают окислительные процессы в организме, что повышает потребность в витамине Е.
Одновременное применение витамина Е в дозе более 400 мг/сут с антикоагулянтами (производными кумарина и индандиона) повышает риск развития гипопротромбинемии и кровотечений.
При одновременном применении витамина Е с циклоспорином повышается абсорбция последнего.

Особые указания

Токоферолы содержатся в зеленых частях растений, особенно в молодых ростках злаков; большие количества токоферолов обнаружены в растительных маслах (подсолнечном, хлопковом, кукурузном, арахисовом, соевом, облепиховом). Некоторое количество их содержится в мясе, жире, яйцах, молоке.

Следует иметь в виду, что у новорожденных с низкой массой тела возможно возникновение гиповитаминоза Е в связи с низкой проницаемостью плаценты (в крови плода содержится лишь 20-30% витамина Е от его концентрации в крови матери).

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не влияет.

Форма выпуска

Раствор для приема внутрь (масляный) 100 мг/мл, 300 мг/мл.

По 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 и 100 мл препарата во флаконы-капельницы оранжевого стекла, укупоренные пробками или пробками-капельницами и навинчиваемыми крышками полимерными из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропилена или укупоренные пробками-капельницами или пробками и крышками из полиэтилена высокого давления или полиэтилена низкого давления.

По 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 и 100 мл препарата во флакон темного стекла, укупоренные пробками или пробками-капельницами из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления, или пробками-капельницами или пробками полимерными из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропилена, и (или) навинчиваемыми крышками из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления, или полимерными из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропилена, или укупоренные средствами укупорочными полиэтиленовыми или полимерными, или крышками навинчиваемыми с «прокладкой» пластмассовой или крышками навинчиваемыми с уплотнительными элементами из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропилена, или укупоренные пробками-капельницами или пробками и крышками из полиэтилена высокого давления или из полиэтилена низкого давления, или колпачками алюминиевыми.

По 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 и 100 мл препарата во флаконы, банки полимерные из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропилена или из полиэтилентерефталата, укупоренные пробками или пробками-капельницами из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или пробками-капельницами или пробками полимерными из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропилена, и (или) навинчиваемыми крышками из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления, или укупоренные крышками полимерными из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропилена, или укупоренные средствами укупорочными полиэтиленовыми или полимерными или крышками навинчиваемыми с «прокладкой» пластмассовой или крышками навинчиваемыми с уплотнительными элементами из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропилена, или укупоренные пробками-капельницами или пробками и крышками из полиэтилена высокого давления или из полиэтилена низкого давления, или колпачками алюминиевыми.

Каждый флакон, флакон-капельницу, банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона макулатурного. Допускается нанесение текста инструкции на пачку.

Допускается укладка флаконов, флаконов-капельниц, банок в групповую упаковку (коробки или ящики из картона) с равным количеством инструкций по применению.

На флакон, флакон-капельницу, банку и каждую единицу потребительской тары наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или самоклеящуюся этикетку.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25°С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на этикетке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Женел РД», Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

Организация, принимающая претензии

ОАО «Самарамедпром», Россия, 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86. Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

Адрес места производства

Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 99 Б.

Самарская обл., Волжский район, пгт. Петра Дубрава, на территории завода «Коммунар», здание №2.

Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКО

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННО

АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ
(ВИТАМИН Е)

Регистрационный номер: ЛП-005546

Торговое наименование: альфа-Токоферола ацетат (витам

Международное непатентованное или группировочное витамин Е.

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь (масля

Состав:

1 мл содержит:

Действующее вещество: d,l-альфа-Токоферола ацетат (Вит и 300 мг.

Вспомогательное вещество: Подсолнечника масло (масл (рафинированное дезодорированное «Первый сорт») – до 1

1 мг d,l-альфа-токоферола ацетата соответствует 1 МЕ.

Описание:

Прозрачная маслянистая жидкость от светло-желтого до тем та без прогорклого запаха. Допускается зеленоватый оттено

Фармакотерапевтическая группа: витамин.

Код АТХ: A11HA03.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Жирорастворимый витамин. Обладает антиоксидантными с водит токсины из организма), предупреждает образование ляет и ограничивает их образование из липидов мембран защиту ненасыщенных жирных кислот; участвует в формир точного вещества, коллагеновых и эластических волокон ткани, гладкой мускулатуры сосудов, пищеварительного тра ливает нарушенное капиллярное кровообращение, нормал ную и тканевую проницаемость, повышает устойчивость тка

Фармакокинетика

Абсорбция из 12-перстной кишки (требует присутствия соле лот, жиров, нормальной функции поджелудочной железы) – вается с бета-липопротеинами крови. При нарушении обмен порт затрудняется. TCmax – 4 ч. Депонируется во всех орг особенно в жировой ткани. Проникает через плаценту и нед дичествах: в кровь плода проникает 20-30% от концентрации Проникает в грудное молоко. Метаболизируется в печени до имеющих хиноновую структуру (некоторые из них обладают тивностью). Выводится с желчью – более 90% (некоторое ко. всасывается и подвергается энтерогепатической циркуляции) (в виде глюкуронидов токоферсиновой кислоты и ее гамма-л дится медленно, особенно у недоношенных и новорожден возможна его кумуляция.

Показания к применению

Профилактика гиповитаминоза Е.

Противопоказания

Гиперчувствительность к препарату, тяжелый атеросклероз-к терий, инфаркт миокарда, повышенный риск развития тромбо

С осторожностью

Гипопротромбинемия (на фоне дефицита витамина К – може при дозе витамина Е более 400 МЕ).

Применение при беременности и в период грудного вскарм

По рекомендации врача.

Способ применения и дозы

Внутрь.

Профилактика гиповитаминоза Е.

Взрослым и детям от 10 лет: мужчинам – 12,1-15,73 МЕ/сут (5 к ра 100 мг/мл или 2 капли раствора 300 мг/мл), женщинам – 7,8 (4 капли раствора 100 мг/мл или 1 капля раствора 300 мг/мл), 12,1-15,73 МЕ/сут (5 капель раствора 100 мг/мл или 2 капли ра мл), кормящим матерям – 12,1-15,73 МЕ/сут (5-6 капель раста или 2 капли раствора 300 мг/мл); детям до 3 лет – 4,84-7,87 МЕ/ раствора 100 мг/мл или 1 капля раствора 300 мг/мл), 3-10 лет – сут (3 капли раствора 100 мг/мл или 1 капля раствора 300 мг/м.

Следует учитывать, что 1 капля 100-300 мг/мл раствора из т ки, флакона-капельницы, флакона с пробкой-капельницей соде и 6,5 мг токоферола ацетата соответственно.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: при приеме в течение длительного периода в дозах сут. (1 мг = 1,21 МЕ) – нечеткость зрительного восприятия, голо головная боль, тошнота, необычайная усталость, диарея, гаст ния; при приеме более 800 ЕД/сут. в течение длительного перио ние риска развития кровотечений у больных с гиповитаминозо ние метаболизма тиреоидных гормонов, расстройства сексуаль тромбофлебит, тромбоэмболия, некротический колит, сепсис, г гипербилирубинемия, почечная недостаточность, кровоизлияни оболочку глаза, геморрагический инсульт, асцит.

Лечение – симптоматическое, отмена препарата, назначение гл ных средств.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Усиливает эффект глюкокортикостероидных и нестероидных пр лительных средств, антиоксидантов. Увеличивает эффективно шает токсичность витаминов А, D, сердечных гликозидов.